

UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA



**FACTORES ASOCIADOS AL RECHAZO A LA TOMA DE
PAPANICOLAOU EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL DE LA I.E.P.
DEFENSORES DE ZARUMILLA, 2020**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA
EN OBSTETRICIA**

AUTORAS:

Bachiller. Moret Jimenez, Karla

Bachiller. Rondón Portilla, Yaneth Verónica

ASESOR:

Mg. Marín Guevara, Leticia Gloria

LIMA – PERÚ

2020

DEDICATORIA

Dedico ésta tesis a mis padres José Moret y Mónica Jiménez que siempre me apoyaron incondicionalmente.

A mis hermanos que siempre me alentaron para no decaer y seguir adelante.

A mi esposo Luis Ciriaco que estuvo a mi lado en cada caída brindándome su cariño, aliento y comprensión para que consiga mis objetivos.

A mis adorados hijos Sebastián y Gianluca quienes son la fuente de motivación e inspiración para progresar y conseguir un futuro mejor, es por ellos por quienes lucho hoy en día.

Karla.

DEDICATORIA

A Dios, por permitirme el logro de una meta que fue más que una quimera e ilusión. A mis padres, los seres humanos más sublimes y francos por ayudarme a cumplir mis sueños con devoción y entusiasmo.

Yaneth.

RESUMEN

Objetivo. Determinar los factores asociados al rechazo de la toma de Papanicolaou en mujeres en edad fértil de la I.E.P. Defensores de Zarumilla, 2020. **Tipo y diseño.** Estudio analítico, diseño observacional casos y controles, y transversal. **Población.** Se conformó por las madres en edad fértil de la I.E.P., considerando 47 casos y 47 controles. **Resultados.** En los factores estudiados, se acepta que los factores: Edad < 30 con OR:4640, situación civil (soltera/separada) con OR: 4.023, Grado de instrucción (hasta primaria) OR:4.354, El Papanicolaou solo se toma si hay alguna molestia, debido a que puede provocar malestares con OR: 4.167, Solo las mujeres con hijos deben de hacer el Papanicolaou OR:5.264, Prefiere no realizarse el examen por temor a enterarse resultado positivo OR:4.940, Realizarse el examen de Papanicolaou es costoso OR:3.826, El Papanicolaou solo debe de ser realizado por un profesional del sexo femenino OR:3.750, El examen de Papanicolaou no detecta oportunamente el cáncer de cuello uterino OR:3.429, Es necesario que su pareja este de acuerdo con la realización del Papanicolaou OR:5.429, El principal propósito de la toma de Papanicolaou es la detección precoz del cáncer cervical OR:7.433, El Papanicolaou toma una muestra de células del cuello uterino OR:5.237, Se conoce también como citología cervical OR:5.434, El objetivo del Papanicolaou es detectar células anómalas del cérvix antes de volverse cáncer OR:3.865, La prueba de Papanicolaou se debe hacer anualmente OR:3.823, sabe cuáles son los tipos de Virus de papiloma humano que pueden causar el cáncer de cuello uterino OR:5.184, Sus familiares mujeres se realizan la prueba de Papanicolaou OR:3.429, Le incentivan y aconsejan a realizarse la prueba sus familiares OR:6.540, Se preocupa su pareja para q se realice la prueba OR:8.760,

Le pregunta y se preocupa por el resultado su pareja OR:7.685 se asocian con el rechazo a la prueba mediante estimación puntual, por cálculo del riesgo: Odds Ratio (OR). **Conclusiones.** los factores sociodemográficos, culturales y familiares se asocian al rechazo de la prueba de Papanicolaou siendo la probabilidad que rechace la prueba es de 9 veces porque su pareja no se preocupa porque se realice la prueba, 8 veces porque su pareja no le pregunta ni se preocupa por el resultado, es 7 veces porque sus familiares no le aconsejan ni incentivan para que se realice la prueba, es 7 veces porque no saben cuál es el principal propósito de la prueba de Papanicolaou, es 5 veces porque consideran necesario que su pareja este de acuerdo con la realización de la prueba, así como consideran que las mujeres con hijos son solo las que deben hacerse la prueba.

Palabras Clave: citología cervical, cáncer, edad fértil.

ABSTRACT

Objective. To determine the factors associated with the rejection of the Pap smear in women of childbearing age from I.E.P. Defenders of Zarumilla, 2020. Type and design. Analytical study, observational design of cases and controls, and cross-sectional. Population. It was formed by the mothers of childbearing age from the I.E.P., considering 47 cases and 47 controls. Results. In the factors studied, it is accepted that the factors: Age <30 with OR: 4,640, marital status (single / separated) with OR: 4,023, Degree of education (until primary) OR: 4,354, The Pap smear is only taken if there is some discomfort, because it can cause discomfort with OR: 4,167, Only women with children should do the Pap smear OR: 5,264, Prefer not to take the test for fear of finding out positive result OR: 4,940, Having a Pap test is expensive OR: 3.826, The Pap smear should only be performed by a female professional OR: 3.750, The Pap test does not detect cervical cancer in a timely manner OR: 3.429, It is necessary that your partner agrees with the Pap smear OR: 5.429, The main purpose of Pap smear is the early detection of cervical cancer OR: 7.433, The Pap takes a sample of X cells from the cervix OR: 5.237, It is also known as cervical cytology OR: 5.434, The ob The objective of the Pap smear is to detect abnormal cells of the cervix before becoming cancer OR: 3.865, The Pap test should be done annually OR: 3.823, you know what types of Human Papillomavirus can cause cervical cancer OR: 5.184 , Their female relatives take the Pap test OR: 3,429, They encourage and advise their family members to take the test OR: 6,540, Your partner worries about the OR test: 8,760, Asks and worries about the result his partner OR: 7,685 are associated with rejection of the test by point estimation, by calculating the risk: Odds Ratio (OR). Conclusions. Sociodemographic, cultural and

family factors are associated with rejection of the Pap test, the probability of rejecting the test being 9 times because your partner does not care about the test, 8 times because your partner does not ask or care for the result, it is 7 times because their relatives do not advise or encourage them to carry out the test, it is 7 times because they do not know what the main purpose of the Pap test is, it is 5 times because they consider it necessary for their partner to be in accordance with the performance of the test, as well as they consider that women with children are only those who should be tested.

Key Words: cervical cytology, cancer, fertile age.